

INVENTARIO DENDROMETRICO

STRATO 344/2020/1

faggete monoplane e biplane a modesta provvigione

29,01 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
19,47	743	7,47	9,87	2,13	6,13	0,27	1,07	5,07	0,00	0,27	0,27	11,20	0,00	1,33
Percentuali		38,4	50,7	11,0		1,4	5,5	26,0	-	1,4	1,4	57,5	-	6,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
167	4831	31	300	8702	4,09	119	2,45%		21	60%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
15	22,95	2,99

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
197	26

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	12,69
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	6,32
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	4,66
faggeta altimontana	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	2,23
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	1,54
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	21-50	0,56
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,53
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	21-50	0,49

STRATO 344/2020/2

faggete monoplane e biplane a discreta provvigione

47,67 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
31,13	1666	8,00	18,61	4,52	3,83	2,78	0,17	10,43	0,00	0,00	1,39	12,35	0,00	3,48
Percentuali		25,7	59,8	14,5		9,1	0,6	34,1	-	-	4,5	40,3	-	11,4

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
268	12790	19	407	19402	5,35	255	1,99%		21	30%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
23	20,50	2,76

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
287	35

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	29,11
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	10,29
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	7,22
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	1,05

STRATO 344/2020/3

faggete monoplane e biplane a buona provvigione

20,07 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
22,83	641	9,33	8,75	4,75	9,08	0,00	1,50	5,75	0,00	0,50	0,00	14,75	0,00	0,33
Percentuali		40,9	38,3	20,8		-	6,6	25,2	-	2,2	-	64,6	-	1,5

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
197	3963	45	347	6965	4,37	88	2,21%		1	88%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
16	21,29	2,84

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
243	32

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	16,90
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	maturo	media (T5-T6)	51-70	1,33
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	1,29
faggeta tipica a dentarie	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	0,55

STRATO 344/2020/4

faggete multiplane

27,92 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
25,33	808	9,33	13,33	2,67	3,62	1,52	0,00	8,19	0,00	1,33	0,00	11,62	0,00	2,10
Percentuali		36,8	52,6	10,5		6,2	-	33,1	-	5,4	-	46,9	-	8,5

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
213	5956	18	385	10749	5,12	143	2,40%		21	76%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
21	21,21	2,73

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
231	29

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	23,22
faggeta tipica a dentarie	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	3,41
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,29

STRATO 344/2020/5

soprassuoli di conifere a discreta provvigione

23,05 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
29,42	757	7,42	20,92	1,08	3,42	4,08	0,25	11,67	0,00	3,08	0,50	5,92	0,00	2,00
Percentuali		25,2	71,1	3,7		14,8	0,9	42,4	-	11,2	1,8	21,5	-	7,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
240	5540	17	403	9290	6,45	149	2,69%		21	50%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
16	31,42	4,19

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
257	33

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	6,03
pineta con orniello	fustaia	biplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	2,97
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	2,90
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	1,49
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	1,22
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	1,21
pineta di pino nero	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,21
pineta di pino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	0-20	1,12
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,87
pineta con orniello	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,79
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	0,76
pineta con orniello	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,61
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,45
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,45
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,38

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,31
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,30

STRATO 344/2020/6

soprassuoli di conifere a buona provvigione

40,01 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
28,50	1254	4,83	17,33	6,33	2,83	2,50	3,33	14,50	0,00	0,17	0,00	7,33	0,00	0,67
Percentuali		17,0	60,8	22,2		8,8	11,7	50,9	-	0,6	-	25,7	-	2,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
249	9976	14	316	12642	3,84	154	1,54%		2	58%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
24	20,07	2,45

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
264	31

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	17,36
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	5,28
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,79
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	2,73
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,04
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	maturato	media (T5-T6)	51-70	1,95
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	maturato	media (T5-T6)	71-100	1,67
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	21-50	1,42
pineta di pino nero	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,12
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	maturato	buona (T3-T4)	21-50	0,82
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,64
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,52
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	0,49
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	0,44
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,42

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	mature	buona (T3-T4)	71-100	0,31

STRATO 344/2020/7**governi misti a modesta provvigione****16,43 ha****area basimetrica fustaia**

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
13,20	375	7,60	5,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	7,20	0,00	4,40	0,00	0,80
Percentuali		57,6	39,4	3,0		-	-	6,1	-	54,5	-	33,3	-	6,1

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
111	1832	0	0	0	0,00	0	0,00%		12	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
38	4,80	4,80	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
5	42,09	5,16

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
149	23

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	5,59
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	4,11
pineta con orniello	overno mist	biplano	adulto	infima (T9)	21-50	1,71
lariceto secondario o sostitutivo	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,52
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,13
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,84
castagneto	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,75
pineta con orniello	overno mist	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	21-50	0,49
robinieto	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	0,29

STRATO 344/2020/8

governi misti a discreta provvigione

20,81 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
21,33	643	6,00	13,56	1,78	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,33	3,33	8,00	0,00	0,67
Percentuali		28,1	63,5	8,3		-	-	23,4	-	20,3	15,6	37,5	-	3,1

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
183	3813	0	0	0	0,00	0	0,00%		21	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
36	8,22	1,33	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
6	29,46	5,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
219	31

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta di pino nero	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	4,74
lariceto secondario o sostitutivo	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	4,65
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	4,53
pineta con orniello	overno mist	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	2,07
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	1,37
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,37
pineta di pino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,27
formazioni transitorie	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	0,69
formazioni transitorie	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	51-70	0,11

STRATO 344/2020/9

cedui

29,13 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
0,00	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentuali		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
0	0	0	0	0					33	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
86	14,67	5,33	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
6	27,08	5,77

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
86	20

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
orno-ostrieto tipico	ceduo	multiplano			71-100	19,50
faggeta con carpino nero	ceduo	monoplano			71-100	5,33
orno-ostrieto tipico	ceduo	multiplano			51-70	1,85
ostrio-querceto	ceduo	monoplano			51-70	1,23
orno-ostrieto tipico	ceduo	monoplano			71-100	0,73
pineta di pino nero	ceduo	multiplano			71-100	0,25
ostrio-querceto	ceduo	monoplano			71-100	0,25