

INVENTARIO TEMATICO



LEGENDA

Hd: altezza dominante

S: statura

IT: raggruppa i dati derivanti dall'inventario tematico

V: volume ad ettaro stimato

G: area basimetrica ad ettaro stimata

Vpi: volume ad ettaro stimato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro stimata dei soggetti preinventariali

ID: raggruppa i dati derivanti dall'inventario dendrometrico

V: volume ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

G: area basimetrica ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

ES: errore standard di stima del volume ad ettaro

Ic: incremento corrente annuo

Nha: numero di piante ad ettaro

Vpi: volume ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/1**

0,40 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 100 allievi/matricine. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 100 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 45,0% | | 346/2020/1500 | 0,05 |
| Quercus pubescens (roverella) | 15,0% | | 346/2020/1524 | 0,25 |
| Fraxinus ornus (orniello) | 10,0% | | 346/2020/1525 | 0,10 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% | | | |
| Fagus sylvatica (faggio) | 10,0% | | | |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/2

0,12 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 100 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 40,0% | | 346/2020/1523 | 0,12 |
| Quercus pubescens (roverella) | 15,0% | | | |
| Larix decidua (larice) | 15,0% | | | |
| Fraxinus ornus (orniello) | 10,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% | | | |
| Fagus sylvatica (faggio) | 10,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/3

1,25 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta pioniera stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura fine, S 12 m, copertura 65%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, 0 allievi/matricine. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 30 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 50,0% | | 346/2020/1570 | 1,25 |
| Fraxinus ornus (orniello) | 15,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% | | | |
| Sorbus aria (sorbo montano) | 10,0% | | | |
| Quercus pubescens (roverella) | 10,0% | | | |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/4**

0,74 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta pioniera stabile, multiplano a distribuzione a cespi, tessitura fine, S 5 m, copertura 25%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 0 allievi/matricine. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 10 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 50,0% | | 346/2020/1522 | 0,32 |
| Fraxinus ornus (orniello) | 15,0% | | 346/2020/1571 | 0,23 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% | | 346/2020/1572 | 0,19 |
| Sorbus aria (sorbo montano) | 10,0% | | | |
| Quercus pubescens (roverella) | 10,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/5

0,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 18 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio) | 70,0% | | 346/2020/1530 | 0,16 |
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 10,0% | | | |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | | |
| Fraxinus ornus (orniello) | 5,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/6

0,09 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su orno-ostrieto tipico, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 12 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 0 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero) | 45,0% | | 346/2020/1526 | 0,09 |
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 25,0% | | | |
| Fraxinus ornus (orniello) | 10,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% | | | |
| Corylus avellana (nocciolo) | 5,0% | | | |
| Quercus pubescens (roverella) | 5,0% | | | |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/7**

0,27 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su ostrio-querceto, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni;

ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 0 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero) | 30,0% | | 346/2020/1527 | 0,11 |
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 25,0% | | 346/2020/1528 | 0,16 |
| Fraxinus ornus (orniello) | 15,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% | | | |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | | |
| Corylus avellana (nocciolo) | 5,0% | | | |
| Quercus pubescens (roverella) | 5,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/9

0,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta tipica a dentarie stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 18 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio) | 85,0% | | 346/2020/1501 | 0,70 |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | | |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0% | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/10

2,72 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, faggeta altimontana stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 22 m, copertura 75%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni;

ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 100 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio) | 40,0% | | 346/2020/1518 | 0,67 |
| Larix decidua (larice) | 30,0% | | 346/2020/1533 | 2,04 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 20,0% | | | |
| Populus tremula (pioppo tremolo) | 5,0% | | | |
| Picea abies (abete rosso) | 5,0% | | | |
| Betula pendula (betulla) | | | | |
| Abies alba (abete bianco) | | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/11

10,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura fine, S 15 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Larix decidua (larice) | 60,0% | | 346/2020/1535 | 2,34 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 30,0% | | 346/2020/1536 | 2,08 |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 5,0% | | 346/2020/1537 | 2,59 |
| Fagus sylvatica (faggio) | 5,0% | | 346/2020/1540 | 1,39 |
| Sorbus aria (sorbo montano) | | | 346/2020/1541 | 1,15 |
| | | | 346/2020/1575 | 0,57 |
| | | | 346/2020/1577 | 0,83 |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/12

61,37 ha, formazioni erbacee, condizionamenti da altri condizionamenti, pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini.

| Unità forestali | area |
|-----------------|-------|
| 346/2020/1505 | 0,32 |
| 346/2020/1509 | 0,47 |
| 346/2020/1510 | 0,95 |
| 346/2020/1511 | 3,74 |
| 346/2020/1512 | 0,29 |
| 346/2020/1517 | 7,25 |
| 346/2020/1519 | 1,20 |
| 346/2020/1521 | 4,47 |
| 346/2020/1529 | 0,51 |
| 346/2020/1543 | 11,73 |
| 346/2020/1548 | 0,24 |
| 346/2020/1549 | 6,01 |
| 346/2020/1551 | 0,21 |
| 346/2020/1552 | 5,38 |
| 346/2020/1554 | 2,47 |
| 346/2020/1558 | 4,29 |
| 346/2020/1564 | 4,32 |
| 346/2020/1565 | 7,52 |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/13**

12,88 ha, condizionamenti assenti, mugheta a rododendri stabile.

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus mugo (pino mugo) | 65,0% | | 346/2020/1532 | 0,49 |
| Larix decidua (larice) | 20,0% | | 346/2020/1542 | 9,45 |
| Sorbus aria (sorbo montano) | 5,0% | | 346/2020/1545 | 0,60 |
| Fagus sylvatica (faggio) | 5,0% | | 346/2020/1546 | 0,47 |
| Picea abies (abete rosso) | 5,0% | | 346/2020/1547 | 0,44 |
| | | | 346/2020/1563 | 0,45 |
| | | | 346/2020/1573 | 0,38 |
| | | | 346/2020/1574 | 0,61 |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/14

5,22 ha, arbusteto, condizionamenti assenti, vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione del pascolo.

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 346/2020/1531 | 1,40 |
| 346/2020/1538 | 2,14 |
| 346/2020/1567 | 1,17 |
| 346/2020/1578 | 0,50 |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/15**

9,71 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 346/2020/1502 | 0,15 |
| 346/2020/1520 | 0,66 |
| 346/2020/1539 | 3,92 |
| 346/2020/1544 | 0,15 |
| 346/2020/1550 | 0,57 |
| 346/2020/1553 | 1,15 |
| 346/2020/1555 | 2,45 |
| 346/2020/1556 | 0,10 |
| 346/2020/1557 | 0,13 |
| 346/2020/1559 | 0,15 |
| 346/2020/1562 | 0,27 |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/16

7,17 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 20 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Larix decidua (larice) | 60,0% | | 346/2020/1534 | 3,90 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 30,0% | | 346/2020/1560 | 3,27 |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 5,0% | | | |
| Fagus sylvatica (faggio) | 5,0% | | | |
| Sorbus aria (sorbo montano) | | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/17

0,89 ha, formazioni erbacee alberate a fustaia, condizionamenti assenti, mugheta a rododendri stabile.

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus mugo (pino mugo) | 80,0% | | 346/2020/1561 | 0,89 |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | | |
| Populus tremula (pioppo tremolo) | 5,0% | | | |
| Betula pendula (betulla) | 5,0% | | | |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/18**

10,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta altimontana stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 15 m, copertura 75%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 80 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio) | 70,0% | | 346/2020/1503 | 0,37 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 10,0% | | 346/2020/1504 | 0,35 |
| Larix decidua (larice) | 10,0% | | 346/2020/1506 | 0,44 |
| Populus tremula (pioppo tremolo) | 5,0% | | 346/2020/1507 | 0,54 |
| Picea abies (abete rosso) | 5,0% | | 346/2020/1508 | 0,87 |
| Betula pendula (betulla) | | | 346/2020/1514 | 0,88 |
| Abies alba (abete bianco) | | | 346/2020/1566 | 0,89 |
| | | | 346/2020/1568 | 0,45 |
| | | | 346/2020/1569 | 1,01 |
| | | | 346/2020/1576 | 5,16 |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/19

0,11 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su orno-ostrieto tipico, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 12 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 0 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero) | 45,0% | | 346/2020/1579 | 0,11 |
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 25,0% | | | |
| Fraxinus ornus (orniello) | 10,0% | | | |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% | | | |
| Corylus avellana (nocciolo) | 5,0% | | | |
| Quercus pubescens (roverella) | 5,0% | | | |

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 346****Comune di Cavedine****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/20**

4,30 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, faggeta altimontana stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 22 m, copertura 75%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 100 allievi/matricine. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio) | 40,0% | | 346/2020/1513 | 3,55 |
| Larix decidua (larice) | 30,0% | | 346/2020/1515 | 0,76 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 20,0% | | | |
| Populus tremula (pioppo tremolo) | 5,0% | | | |
| Picea abies (abete rosso) | 5,0% | | | |
| Betula pendula (betulla) | | | | |
| Abies alba (abete bianco) | | | | |

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 346/2020/21

3,06 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 20 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE: | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Larix decidua (larice) | 60,0% | | 346/2020/1516 | 3,06 |
| Pinus mugo (pino mugo) | 30,0% | | | |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 5,0% | | | |
| Fagus sylvatica (faggio) | 5,0% | | | |
| Sorbus aria (sorbo montano) | | | | |